



VELSIMEX, S.A. DE C.V.
CALIDAD QUE PREVALECE

AGROMECTIN 1.8 CE

Insecticida y/o acaricida agrícola

Concentrado emulsionable

Producto registrado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

Abamectina (avermectina): Mezcla de avermectina B1
conteniendo no más de 80% de avermectina B1a
y no menos de 20% de avermectina B1b

No menos de:0.80%

(Equivalente a 18 g de I.A./L)

Ingredientes inertes:

Solvente y emulsificante

No más de:98.20%

Total:100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno).

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado), lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.



VELSIMEX, S.A. DE C.V.

CALIDAD QUE PREVALECE

Advertencia sobre riesgos: AGROMECTIN 1.8 CE, es un producto moderadamente tóxico para humanos y animales domésticos, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.

No almacenar en casas habitación. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MODERADAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

AGROMECTIN 1.8 CE actúa durante los estados larvales de los minadores de hoja. Inmoviliza las plagas poco después de la exposición; la mortalidad máxima se alcanza entre los 3 y 5 días. Se puede utilizar en tratamientos preventivos y/o para el control de la plaga ya establecida.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Mida cuidadosamente la cantidad de AGROMECTIN 1.8 CE y haga una premezcla en un poco de agua hasta obtener una solución homogénea. Llene la mitad del tanque de la aspersora, agregue la premezcla, agite constantemente, utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) y complete con la cantidad de agua calculada en la calibración. Una vez que el producto se mezcla con agua mantenga la mezcla en agitación y aplíquela el mismo día de su preparación. Este producto puede ser aplicado con equipo aéreo y terrestre (mochila o tractor).



VELSIMEX, S.A. DE C.V.

CALIDAD QUE PREVALECE

CONTRAINDICACIONES: No se aplique en las horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (más de 10 km /h) y/o si existe una alta probabilidad de lluvia.

INCOMPATIBILIDAD: No es compatible con materiales de reacción alcalina. La mezcla con otros productos deberá ser con aquellos que cuenten con registro vigente y que estén autorizados para los cultivos aquí indicados.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para el cultivo de jitomate a la dosis recomendada en esta etiqueta.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lave la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Glicósido-lactonas macrocíclicas.

Síntomas de intoxicación: En caso de contacto puede provocar irritación en ojos y piel, así como reacciones alérgicas a personas sensibles. En caso de ingestión puede presentarse depresión general, dificultad para respirar o sensación de falta de aire.

Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento recomendado es sintomático. Provocar el vómito si no se ha producido espontáneamente y continuar con lavado gástrico.



VELSIMEX, S.A. DE C.V.

CALIDAD QUE PREVALECE

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine con este producto agua corriente, depósitos o fuentes de agua. Después de realizar el triple lavado, maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Este producto es tóxico a peces.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales.

Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V., garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)	Momento de aplicación
	Nombre común/científico		
Jitomate (3)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>)	1.0-1.5	Aplicar en cuanto aparezcan los adultos de minadores de hojas. Repetir la aplicación al menos con intervalos de 7 días o como sea necesario para mantener el control. Usar las dosis mayores en infestaciones altas y cuando las plantas sean grandes y densas durante la época de crecimiento. Asegurar una cobertura total de las plantas.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Periodo de reentrada: 24 horas después de la aplicación.

VELSIMEX, S.A. DE C.V.

Av. Central Núm. 206 3er. piso - Col. San Pedro de los Pinos - 01180 México, D.F.

Tel.: 5278-4640 - Fax: 5278-4678