



PERVEL 34 CE

Insecticida y/o acaricida agrícola

Concentrado emulsionable

Producto registrado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

Permetrina: 3-fenoxibencil (1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2 –
dimetilciclopropano carboxilato (60% de isomero trans y 40%
de isomero cis)

No menos de:33.66%

(Equivalente a 336 g de I.A./L)

Ingredientes inertes:

Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados

No más de:66.34%

Total:100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, gafas o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.



Advertencia sobre riesgos: PERVEL 34 CE, es un producto moderadamente tóxico para humanos y animales domésticos, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos. No almacenar en casas habitación, no deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años, no se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MODERADAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

PERVEL 34 CE, es un insecticida piretroide formulado como concentrado emulsionable. Actúa por contacto e ingestión y es recomendado para el control de las plagas que se indican en el cuadro.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: PERVEL 34 CE es un concentrado emulsionable que debe diluirse en la cantidad de agua suficiente y necesaria para lograr un cubrimiento total y uniforme de las plantas a tratar. Se puede utilizar aspersores terrestres de alto y bajo volumen o en aplicaciones aéreas. Los volúmenes de agua a utilizar son de 40-60 litros en el caso de aplicación aérea, y de 200 a 400 litros de agua por hectárea para equipo de aplicación terrestre de tractor o manual.

CONTRAINDICACIONES: Se sugiere hacer las aplicaciones temprano en la mañana o por la tarde, cuando las temperaturas no sean altas. No aplicar si existe una alta probabilidad de lluvia próxima a fin de evitar la pérdida del producto por lavado. No aplicar si la velocidad del viento es alta (más de 10 km/h). No aplicar cuando las abejas y otros polinizadores estén en el cultivo.



INCOMPATIBILIDAD: PERVEL 34 CE no es compatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: PERVEL 34 CE no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Piretroides.

Síntomas de intoxicación: Nerviosismo, ansiedad, debilidad general, convulsiones, reacciones alérgicas en la piel y vías respiratorias, estornudos, rinitis, vómito, diarrea e incoordinación.

Tratamiento y antídoto: No hay antídoto específico, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Puede administrarse por vía intravenosa fenobarbital, medicamentos anticonvulsivos o los del grupo del diazepam. También se puede administrar adrenalina (0.1-0.5 ml al 1 x 1,000) vía intravenosa o subcutánea;



repetir si se presenta dificultad respiratoria o hipotensión. La atención debe ser dada a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine con este producto agua corriente, depósitos o fuentes de agua. Después de realizar el triple lavado, maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Este producto es tóxico a peces y abejas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V., garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUI RECOMENDADOS

Cultivo	Plagas		Dosis 1,000 L/ha	Intervalo de seguridad
	Nombre común	Nombre científico		
Aguacatero	Minador de la hoja Gusano confeti	<i>Gracillaria sp</i> <i>Pyrrhopyge chalibeia</i>	0.2-0.3	14
Algodonero	Gusano bellotero Gusano rosado Perforador de la hoja	<i>Heliothis zea, H. virescens</i> <i>Pectinophora gossypiella</i> <i>Bucculatrix thurberiella</i>	0.4-0.6	14
Apio	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	0.3-0.5	3
Berenjena	Gusano del fruto	<i>Heliothis zea</i>	0.4-0.6	3
Brócoli	Gusano falso medidor Palomilla dorso de diamante	<i>Trichoplusia ni</i> <i>Plutella xylostella</i>	0.4-0.6	7
Calabaza	Gusano falso medidor	<i>Trichoplusia ni</i>	0.4-0.6	7
Chile Bell	Gusano falso medidor Gusano soldado	<i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i>	0.4-0.6	3
Col	Gusano del corazón	<i>Copitarsia consueta</i>	0.3-0.5	1
Col de Bruselas	Mariposa blanca de la col	<i>Pieris rapae, Leptophobia aripa</i>	0.3-0.5	1
Coliflor	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	0.3-0.5	1
Espárrago	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	0.3-0.5	1
Espinaca	Gusano soldado Gusano falso medidor	<i>Spodoptera exigua</i> <i>Trichoplusia ni</i>	0.2-0.3	7
Jitomate	Gusano del fruto Minador de la hoja Gusano alfiler	<i>Heliothis zea</i> <i>Liriomyza munda</i> <i>Keiferia lycopersicella</i>	0.4-0.6	7
Lechuga	Gusano falso medidor	<i>Trichoplusia ni</i>	0.2-0.3	1
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3-0.5	1
Manzano	Palomilla de la manzana	<i>Cydia pomonella</i>	0.2-0.3	14
Melón	Gusano falso medidor	<i>Trichoplusia ni</i>	0.4-0.6	7
Papa	Palomilla de la papa Gusano soldado	<i>Phthorimaea operculella</i> <i>Spodoptera exigua</i>	0.4-0.6	1
Pastos	Mosca pinta	<i>Aeneolamia postica</i>	0.4-0.5	Sin límite
Pepino	Gusano falso medidor Gusano del fruto	<i>Trichoplusia ni</i> <i>Heliothis zea</i>	0.4-0.6	7
Peral	Palomilla de la manzana	<i>Cydia pomonella</i>	0.2-0.3	1
Sandía	Gusano del fruto Gusano falso medidor	<i>Heliothis zea</i> <i>Trichoplusia ni</i>	0.4-0.6	7
Soya	Gusano falso medidor Gusano terciopelo	<i>Trichoplusia ni</i> <i>Anticarsia gemmatilis</i>	0.3-0.6	15

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. (SL): Sin límite.

VELSIMEX, S.A. DE C.V.
CALIDAD QUE PREVALECE



VELSIMEX, S.A. DE C.V.

Av. Central Núm. 206 3er. piso - Col. San Pedro de los Pinos - 01180 México, D.F.

Tel.: 5278-4640 - Fax: 5278-4678