



VELFIDOR 350 SC

Insecticida agrícola

Suspensión acuosa

Producto registrado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

Imidacloprid: 1-[(6-cloro-3-piridin-3-ilmetil)-

N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina

No menos de:30.20%

(Equivalente a 350 g de I.A./L)

Ingredientes inertes:

Humectante, dispersante, antiespumante, solvente, aglutinante y diluyente

No más de:69.80%

Total:100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno).

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado), lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.



Advertencia sobre riesgos: VELFIDOR 350 SC, es un producto moderadamente tóxico para humanos y animales domésticos, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casas habitación. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MODERADAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

VELFIDOR 350 SC (imidacloprid) es recomendado para el control de mosquita blanca (*Bemisia tabaci*) en los cultivos del cuadro.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Mida cuidadosamente la cantidad de VELFIDOR 350 SC y haga una premezcla en un poco de agua hasta obtener una solución homogénea. Llene la mitad del tanque de la aspersora, agregue la premezcla, agite constantemente utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) y complete con la cantidad de agua calculada en la calibración.

CONTRAINDICACIONES: No hacer aplicaciones en horas de calor intenso, si la velocidad del viento es alta (más de 10 km/h) o si se tiene una alta probabilidad de lluvia próxima, a fin de evitar el lavado del producto.

INCOMPATIBILIDAD:



VELFIDOR 350 SC es incompatible con productos de fuerte reacción alcalina. La mezcla con otros productos, será con aquellos que cuenten con registro vigente y que están autorizados para los cultivos aquí indicados.

FITOTOXICIDAD: VELFIDOR 350 SC no es fitotóxico a las dosis aquí recomendadas.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lave la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Cloronicotinilos.

Síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza, dermatitis, visión borrosa, fatiga, titiriteo, salivación. En casos severos calambres musculares y convulsiones.

Tratamiento y antídoto: Debe ser sintomático. Evaluar presión sanguínea y frecuencia del pulso, dar respiración artificial si aparecen signos de parálisis.

Aplicar medidas terapéuticas para eliminación de la sustancia del cuerpo (lavado gástrico, laxantes salinos).



MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine con este producto agua corriente, depósitos o fuentes de agua.

Después de realizar el triple lavado, maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Este producto es tóxico a peces.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales.

Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS

Cultivos	Plaga	Dosis	Aplicación
Jitomate (21) Chile (21) Papa (7) Tabaco (SL)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	Pretrasplante 2 ml/1,000 plántulas postrasplante 1.0-1.25 L/ha.	Pretrasplante: 3 días antes del trasplante, dirigiendo la aspersión directamente a las charolas germinadoras. Diluya 2 ml de VELFIDOR 350 SC en medio litro de agua y asperje con atomizador toda la mezcla sobre las charolas que contengan 1,000 plantitas. Una vez establecidas las plantas en campo, aplicar de 5 a 7 días después del trasplante. Es indispensable que el suelo esté húmedo al momento de hacer la aplicación para que el producto llegue a la zona radicular y se incorpore cuanto antes a la planta.
Aguacatero (14)	Escama (<i>Hemiberlesia lataniae</i>)	5.6 ml/árbol	Realizar una aplicación al suelo dirigida al área de goteo. Volumen de aplicación: 50 L/árbol. Diluir la dosis en 1 L de agua y después esa solución en más agua para completar el volumen de 50 L/árbol.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

(SL): Sin límite.
Periodo de reentrada: 12 horas después de la aplicación.

VELSIMEX, S.A. DE C.V.

Av. Central Núm. 206 3er. piso - Col. San Pedro de los Pinos - 01180 México, D.F.

Tel.: 5278-4640 - Fax: 5278-4678