



VELQUAT

Herbicida no selectivo

Solución acuosa

Producto registrado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

Paraquat: Sal dicloruro de paraquat (1,1' dimetil 4,4' bupiridilio)
con un contenido de ion paraquat no menor de 72.4%

No menos de:25.00%

(Equivalente a 200 g de I.A./L)

Ingredientes inertes:

Diluyente (agua), humectante y estabilizante

No más de:75.00%

Total:100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

VELQUATMR/VELOXONE/PARAQUAT 25 es un producto moderadamente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casas-habitación. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyase.

Lea cuidadosamente las instrucciones: Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo y formulación del producto plaguicida (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de



neopreno). Evite derrames accidentales del producto y en caso de tenerlos utilizar materiales como aserrín para su absorción. No coma, beba o fume durante el manejo del producto. No permita el acceso a las áreas de almacenamiento, formulación y envasado de plaguicidas, a personas ajenas o no autorizadas. Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

MODERADAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

VELQUAT^{MR}/VELOXONE/PARAQUAT 25 es un herbicida de contacto no selectivo que controla malezas de hoja ancha y angosta. Es un herbicida soluble que actúa destruyendo la clorofila. Por lo tanto, destruye todos los vegetales verdes con los que tenga contacto, ya sean malas hierbas o plantas cultivadas.



USESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y MALEZAS AQUI RECOMENDADOS
USO RESTRINGIDO

Malezas que controla	
Escobilla	<i>Sida neomexicana</i>
Rosa amarilla	<i>Melampodium divaricatum</i>
Golondrina	<i>Euphorbia hirta</i>
Frijolillo	<i>Rhynchosia minima</i>
Nubecilla	<i>Parthenium hysterophorus</i>
Zacate plumilla	<i>Leptochloa filiformis</i>
Higuerilla	<i>Ricinus communis</i>
Tomatillo	<i>Physalis sp</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Quelite	<i>Amaranthus sp</i>
Legua de pájaro	<i>Polygonum aviculare</i>
Quelite cenizo	<i>Chenopodium album</i>
Polígono trepador	<i>Polygonum convolvulus</i>
Girasol	<i>Helianthus annuus</i>
Quesillo	<i>Anoda cristata</i>
Trébol dulce	<i>Melilotus indicus</i>
Oreja de ratón	<i>Sida hederacea</i>
Nabo silvestre	<i>Brassica campestris</i>
Zacate gramma	<i>Cynodon dactylon</i>
Luzaga	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Zacate de agua	<i>Echinochloa colonum</i>
Zacate Johnson	<i>Sorghum halepense</i>
Alpistillo	<i>Phalaris minor</i>
Avena loca	<i>Avena fatua</i>

Cultivo	Dosis (L/ha)	Epoca de aplicación
Maíz	1.0-2.0	Aplicación dirigida cubriendo todo el follaje de las malezas, sin tocar el cultivo.
Aguacatero, alfalfa, cítricos, café, durazno, guayabo, manzano, papayo, peral y plátano	1.5-3.0	Malezas en crecimiento activo entre 5 y 15 cm de altura.
Brócoli, calabacita, caña de azúcar, cártamo, cebolla, chicharo, col, coliflor, espárrago, frijol, girasol, jitomate, lechuga, melón, papa, pepino, piña, sandía, soya y zanahoria	1.5-2.0	Malezas en crecimiento activo entre 5 y 15 cm de altura. Aplicar con equipo protector (campana) dirigiendo la aspersión a la maleza.

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones
En estos cultivos se puede hacer aplicaciones de presiembra o preemergencia. El producto se inactiva al contacto con el suelo y no afecta la emergencia de los cultivos	1.5-3.0	Postemergente a malezas en terreno preparado. En terrenos arenosos aplique 3 días antes de la emergencia del cultivo.
Desección y/o defoliación		
Sorgo, trigo y cebada	1.5-2.0	Cuando el grano este maduro y con humedad de 25 a 37%.
Frijol y soya	0.5-1.5	Cuando el grano esté maduro.
Caña de azúcar	1.5-3.0	Desección, quemar y cosechar de 4 a 7 días después de aplicar.
Cártamo y girasol	1.5-3.0	Cuando el grano esté maduro.
Algodón	1.0-2.0	Cuando 80-95% de las bellotas estén abiertas y el resto maduras.



MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRO-DUCTO: La cantidad de VELQUAT^{MR}/VELOXONE/PARAQUAT 25 y agua varían de acuerdo con la altura y cantidad de follaje de la maleza. Normalmente se usan de 400-600 litros de agua por hectárea trabajada haciendo una mezcla de 0.75 a 1.25 litros de VELQUAT^{MR}/VELOXONE/PARAQUAT 25 en cada 200 litros de agua. Recomendamos las siguientes dosificaciones en control de malezas.

CONTRAINDICACIONES: Evítese que se desvíe la aspersion por arrastre del viento u otra causa. No aplicar cuando haya cultivos vecinos susceptibles a menos de 1 km de distancia o cuando los vientos sean de más de 8 km/h, capaces de arrastrar el producto. Aplíquese al amanecer o al atardecer y que no se tengan probabilidades de lluvia al poco tiempo de realizar la aplicación a fin de evitar el lavado del producto. Utilice solamente agua limpia para hacer la dilución. Lave perfectamente el equipo de aplicación antes de utilizarlo para aplicar cualquier producto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con herbicidas residuales, pero no se recomienda el empleo de estas mezclas en áreas cultivadas.

Se recomienda hacer la prueba previa si se desea aplicarlo en mezcla con otro producto.

FITOTOXICIDAD: Como herbicida no es selectivo y actúa rápidamente.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar bien ventilado, si es posible bajo techo, quite la ropa contaminada y manténgala abrigada y en reposo. En caso de contacto con la piel, lavar el área afectada con jabón o detergente suave y enjuagar con gran cantidad de agua.



Si el contacto fue con los ojos, enjuagarlos profusamente con agua o solución salina normal durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Obtener atención médica para que realice un lavado gástrico. En caso de inhalación, colocar a la víctima inmediatamente en un área con aire fresco. Si la respiración hubiera cesado aplicar respiración artificial. Mantener a la persona abrigada y en reposo.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Síntomas de intoxicación: Irritación gastrointestinal, pérdida del apetito, náuseas, pérdida de peso, fatiga, dolor de cabeza, insomnio, convulsiones.

Tratamiento y antídoto específico: No hay antídoto específico, por lo que el tratamiento médico deberá ser sintomático, dirigido a contrarrestar las convulsiones, restaurar y mantener la oxigenación tisular. No administre atropina, morfina, epinefrina y noradrenalina ya que están contraindicadas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos. En caso de derrame, absorber el producto con inertes en polvo, aserrín o ceniza. Dejar el tiempo suficiente para asegurar la absorción total del producto y enterrar los desechos de acuerdo a las regulaciones locales.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave; alejado del calor o fuego, alimentos, ropa, forraje y animales. Los sobrantes no utilizados deben

VELSIMEX, S.A. DE C.V.
CALIDAD QUE PREVALECE



conservarse en su envase original bien cerrado. No se utilice el envase, destrúyase y entiérrese de acuerdo a las regulaciones ambientales locales.

GARANTÍA: Como el manejo, transportación y almacenamiento del producto están fuera de nuestro control no nos hacemos responsables del uso del mismo y únicamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.

VELSIMEX, S.A. DE C.V.

Av. Central Núm. 206 3er. piso - Col. San Pedro de los Pinos - 01180 México, D.F.

Tel.: 5278-4640 - Fax: 5278-4678