

Familia: Insecticida
Uso: Agrícola
Formulación: Granulado
Registro: RSCO-INAC-0115-450-005-005



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo: CLORPIRIFOS ETIL: 0,0-dietil 0 – (3,5,6,-tricloro-2-piridinil) fosforotioato (Equivalente a 50 g de i.a./kg)	% en peso 5.00
Ingredientes inertes: Acarreador	95.00
Total	100.00

SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ADVERTENCIA



Nocivo en caso de ingestión
 Nocivo si se inhala

CATEGORÍA DE PELIGRO Y COLOR DE BANDA: 4, PRECAUCIÓN, AZUL.

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre su equipo de aplicación

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y PLAGA AQUÍ RECOMENDADOS

VELBAN 5-G es un insecticida organofosforado de corta persistencia que actúa por contacto, ingestión o inhalación previniendo y/o controlado a las poblaciones de insectos que se desarrollan en el suelo. Es una formulación granular lista para usar en maíz.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ ha	INTERVALO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MAÍZ	GUSANO DE ALAMBRE	<i>Agriotes lineatus</i>	25 en banda 50 Aplicación total	21	Velban 5G ofrece un buen control durante 7 a 12 días cuando no hay lluvias en este periodo. Sin embargo, deberá repetirse el tratamiento cuando el grado de infestación lo requiera.

PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Abra el empaque por la pestaña superior, evitando inhalar o tener contacto con el producto. **VELBAN 5-G** no requiere preparación, se aplica tal y

como viene. Puede usarse equipo manual o tractor, procurando distribuir el producto siempre en forma uniforme ya sea en aplicación total o en banda e incorporarlo al suelo por medio de un paso de rastra y una cruz, una o dos semanas antes de la siembra. **VELBAN 5-G** también puede ser aplicado en mezcla con fertilizantes granulados al momento de la siembra.

Aplicación al suelo: Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica de 2 a 3 días antes de la siembra del cultivo. En terrenos recién barbechados después de una aplicación total, incorpórese con un paso de rastra y uno de cruz.

Aplicación en bandas: Se deben aplicar abajo de la semilla en el área donde se va a desarrollar la raíz. La incorporación al suelo NO tiene que ser inmediata.

Aplicación terrestre: Equipo terrestre de tipo "SALERO", mochila manual o motorizada y de tractor. Nota: Asegúrese de que el uso de métodos de aplicación del producto estén de acuerdo con los reglamentos de la localidad, si existiese alguna duda al respecto, consulte a la autoridad agrícola local o al campo agrícola experimental más cercano.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar si la velocidad del viento es alta (más de 10 km/h). Vierta los gránulos en la misma dirección del viento y nunca haga aplicación al nivel de la cara. Aplique todo el producto depositado en el equipo de aplicación.

INCOMPATIBILIDAD: No se mezcle ni aplique con productos de naturaleza alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos. Para la mezcla con otros productos se tomará en cuenta que tengan registro vigente, y estén autorizados para los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto".
- "No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes".
- "Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos".
- "Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos".
- "No almacene en casas habitación".
- "No use el producto sin el equipo de protección adecuado".

- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada a fin de evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en reposo. Si existió contacto de la piel con el producto, lave la parte afectada con agua corriente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua tibia salada (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua), repitiendo esta operación hasta que el vómito sea claro. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: ORGANOFOSFORADOS.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN. Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, ansiedad, temblor, calambres, vómito, diarrea y dolor abdominal. Agudos: Pupilas puntiformes, dificultad respiratoria, congestión bronquial, edema pulmonar, debilidad severa, pérdida de control de esfínteres y convulsiones.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: En caso de adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico.

Cuando los síntomas sean severos, administrar de 2 a 5 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente, cada 5 a 15 minutos, hasta completa atropinización.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

- “En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.

Este producto es **ALTAMENTE TÓXICO** para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves)
Este producto es **EXTREMADAMENTE TÓXICO** para animales (peces invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

Este producto es **ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS**. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentren libando.

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.