

Uso: Agrícola

Formulación: Polvo humectable

Registro: RSCO-INAC-0185-X0362-002-0.204

Código OMRI: vel-22471

Presentación: 1 kg



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo % en peso

Piretrina: Extracto de piretro 0.204 %
 (Equivalente a 2 g de i.a./kg)

Ingredientes inertes

Adherente, dispersante, desecantes y diluyente 99.796 %

T O T A L 100.000 %

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

PIRELÍN 0.2% PH es un insecticida del grupo de las piretrinas naturales que actúa por contacto e ingestión, formulado como polvo humectable, recomendado para el control de la plaga que se indica en los siguientes cultivos:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Zarzamora, Arándano, Grosella, Frambuesa, Fresa, Kiwi, Vid (SL)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 – 3.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga.
	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)		
Jitomate, Berenjena, Chile, Papa, Pimiento morrón, Tomate verde (SL)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 – 3.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga.
	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)		

	Pulgón saltador (<i>Bactericera cockerelli</i>)		
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (SL)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5 – 3.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga.
Aguacatero (SL)	Trips (<i>Scirtothrips sp.</i>)	1.5 – 3.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga.
Limón, Toronjo, Lima, Mandarina, Naranja, Pomelo, Cidra, Tangerino (SL)	Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1.0 – 2.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga.
Brócoli, Col de Bruselas, Col, Coliflor, Mostaza, Colza, Colinabo (SL)	Pulgón cenizo (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	1.5 – 2.5	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga.
Cebolla, Ajo, Poro, Espárrago, Cebollín (SL)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	2.0 – 3.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga.
Mango (SL)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i> / <i>Frankliniella parvula</i>)	1.5 – 3.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten las primeras ninfas y adultos de las plagas.
	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	2.0 – 3.0	

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite
Periodo de reingreso a los lugares tratados: 12 horas después de la última aplicación.

Categoría toxicológica 5, ATENCIÓN

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

PIRELÍN 0.2% PH se diluye en agua y se aplica con aspersores manuales o motorizadas. Se deberá usar tanta agua como sea necesario para tener un buen cubrimiento del follaje. Las dosis anteriores deberán ajustarse según la infestación, tamaño del cultivo y las características del equipo de aplicación.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar **PIRELÍN 0.2% PH** en horas de calor intenso, cuando la luz del sol sea directa o cuando las temperaturas exceden los 32°C. No aplicar con vientos fuertes (> a 10 km/h), o si existe alta probabilidad de lluvia. No pastorear ganado en áreas tratadas.

INCOMPATIBILIDAD

PIRELÍN 0.2% PH solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados, realizando pruebas previas a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno) almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado y de manera separada de la ropa de uso común) lavándolos con detergente y cloro. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.

- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Mueva a la víctima al aire fresco. Busque ayuda médica si se presentan síntomas adversos como tos, dificultad para respirar o sensación de quemazón en el tracto respiratorio. Si ha dejado de respirar proporcione respiración artificial.

Contacto con la piel: Lávese cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada.

Contacto con los ojos: Si entra a los ojos, enjuague con mucha agua durante 15 minutos.

Ingestión: Si la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente administrando agua tibia salada. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si la persona está inconsciente, no debe administrar nada por la boca. Consiga atención médica inmediatamente.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Producto de origen botánico. Extracto de piretro (mezcla de piretrinas).

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Ingestión: puede ocasionar trastornos digestivos como dolor estomacal, náuseas, diarrea o vómito. En caso de contacto con los ojos o la piel puede provocar irritación. Si el producto fue inhalado puede provocar nerviosismo, ansiedad y estornudos.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe tratamiento específico. Administrar al paciente tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.